








































enfermedades venéreas

enfermedad	examen médico obligatorio	diagnóstico	posibles signos de enfermedad
gonorrea	sí cada 6 semanas	análisis de frotis  análisis de orina 	 flujo amarillento o apesoso del pene, del recto o de la vagina  dolores, picazón o ardor al orinar  dolor de garganta después del sexo oral
sífilis	sí cada 12 semanas	análisis de sangre 	 bulto o úlcera al pene, al recto, a la vagina o en la boca/garganta  ganglios linfáticos agrandados, erupción
VIH/sida	sí cada 12 semanas	análisis de sangre 	con frecuencia ningún signo durante largo tiempo
clamidia	no	análisis de frotis  análisis de orina 	 flujo amarillento o apesoso del pene, del recto o de la vagina  dolores, picazón o ardor al orinar  dolor de garganta después del sexo oral  dolores durante el sexo
hepatitis B o C	no	análisis de sangre 	 con frecuencia ningún signo ictericia

Indicaciones importantes:

- Se retira la cartilla de sanidad en gonorrea, sífilis o VIH positivo.
- Exámenes ginecológicos también son necesario! El examen médico obligatorio p.e. no incluye un frotis cervical. Para hombres los profundos urológicos (urólogos) son importantes. Recomendación: al menos un control mensual; p.e.: www.docfinder.at
- Por favor consulte con un médico con todos signos de enfermedad!
- En Austria hay opciones de tratamiento adecuado por estos enfermedades.
- En algunas enfermedades los compañeros también necesitan tratamiento!
- Hay vacunaciones de pago por hepatitis B y VPH. Pregunte a su médico!


transmisión y protección

transmisión	posibles enfermedades	protección contra infección
sexo vaginal 	VIH, sífilis, hepatitis B y C, gonorrea, clamidia	preservativo 
sexo anal  	VIH, sífilis, hepatitis B y C, gonorrea, clamidia	preservativo 
sexo oral  	VIH, sífilis, Hepatitis B y C, gonorrea, clamidia	preservativo, „tela de latex“  
besar  	sífilis, hepatitis B	no besar  
mano, juguete sexual  	sífilis, gonorrea, clamidia	preservativo, „tela de latex“, guantes de látex   
sangre 	VIH, hepatitis B y C	preservativo, guantes de látex, ningún contacto con sangre   

Sexo oral sin protección = peligro de contagio !!! (p.e.: sífilis, VPH,...)

Aplicación correcta del preservativo:

- El pene tiene que ser rígido cuando se pone el preservativo!
- Retraiga el prepucio, presione la punta del preservativo con los dedos y ponga en el pene.
- Sostenga la punta del preservativo, desenrollelo!
- Siempre desenrolle el preservativo completamente hacia atrás !
- Saque el pene después de la eyaculación antes que esté flácido !



Si tiene preguntas, por favor dirijase a un centro de asesoramiento para trabajadoras del sexo! Allí recibe asesoramiento y apoyo **gratuito y confidencial**. Direcciones véase en el folleto „Sexwork-Info“! Este folleto se recibe p.e. en los departamentos de salud austriacos (regionales).

Resumen de los MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

método	mécánico		hormonal	químico		natural
anticonceptivo	♂ ○ preservativo	♀ ○ diafragma ○ capuchón cervical ○ etc.	♀ ○ píldora ○ inyección de hormonas ○ parches ○ DIU hormonal ○ anillo vaginal ○ implante	♀ ○ DIU de cobre	♀ ○ supositorios ○ cremas ○ tabletas	♀ ○ medir la temperatura ○ observación del moco cervical ○ calendario
descripción	Ponga el preservativo al pene antes del sexo. Evita un embarazo y transmisiones de las enfermedades sexualmente trasmisibles.	Pongalo en la vagina enfrente del cuello del útero antes del sexo. Evita que los espermatozoides lleguen en el útero.	Disponible con ginecológicos. Cambios hormonales en el cuerpo evitan la posibilidad de un embarazo.	Ginecológicos lo ponen en el útero. Evita la implantación del posible óvulo fecundado. Ginecológicos pueden eliminarlo. Sustitución después de 3-5 años.	Pongalo en la vagina antes del sexo. Mata espermatozoides.	Determinación de los días fértiles y estériles. En los días fértiles se necesita un segundo método anticonceptivo, p.e. un preservativo.
Como y donde disponible?	○ tiendas eróticas ○ supermarkt ○ droguería ○ farmacia	○ visita a un ginecológico recomendado ○ farmacia	○ visita a un ginecológico obligatorio	○ visita a un ginecológico obligatorio	○ farmacia	
eficaz con uso CORRECTO	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
protección de las enfermedades sexualmente trasmisibles	SÍ	NO	NO	NO	NO	NO

„Píldora del día siguiente“ – sólo en caso necesario: tiene que tomarla a más tardar dentro de 72 horas del sexo sin protección- la recibe sin receta en farmacias y ambulancias ginecológicas (en el hospital). **No protege** contra las enfermedades sexualmente trasmisibles y VIH/sida!

Esponjas vaginales – esponjas menstruales: **No protege** contra las enfermedades sexualmente trasmisibles y VIH/sida, **tampoco** contra embarazo!